

Olasford Wiah

Directeur

Division pour les services de
santé communautaire

Ministère de la santé

Liberia

Liberia : Répondre à la COVID-19 à travers le système national de santé communautaire

La réponse du Liberia à la COVID-19

Programme national des
Assistants de Santé
communautaire du
Gouvernement du Liberia



GOVERNEMENT DU LIBERIA : PROGRAMME NATIONAL DES ASSISTANTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE



3.3M de visites

Visites à domicile menées, y compris 229 562 visites dans le cadre de grossesses



3797

Prestataires recrutés par le programme en tant qu'agents de santé communautaire, infirmiers et sages-femmes



1,020,807

Cas de paludisme, de pneumonie, de malnutrition et de diarrhée traités parmi les enfants de moins de 5 ans




4622

Evènements épidémiques potentiels identifiés par des agents de santé communautaire


Février 2020







AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE DIAGNOSTIQUENT ET TRAITENT 1/5 DE TOUS LES CAS CONFIRMES DE PALUDISME AU LIBERIA



ENFANTS RECEVANT DES SOINS DE LA PART D'UN PRESTATAIRE QUALIFIE A AUGMENTE DE 50%



TRAITEMENT DES MALADIES INFANTILES A AUGMENTE DE 30% ; NAISSANCES EN PRESENCE D'UN PERSONNEL QUALIFIE ONT AUGMENTE DE 30%.



Community Health Workers


Participant Handbook



Community Event Based Surveillance for

Coronavirus (COVID-19)

CEBS Flow Chart for CHWs



REPONSE AU COVID19 AU SEIN DES COMMUNAUTES : ROLE DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE

Prévenir	Sensibiliser les communautés en matière de signes, de symptômes, de voies de transmission, et de mesures individuelles de prévention comme la distanciation sociale, l'hygiène des mains, tousser ou éternuer dans le coude et les interventions WASH
	Établir des stations de lavage des mains dans les communautés et dans les établissements de santé.
	Soutenir, défendre ou renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections au sein des communautés et des établissements, telles que la construction de zones de triage et l'utilisation d'équipement de protection individuelle.
	Préparer les systèmes de santé et les communautés pour l'introduction rapide de vaccins (en cours de développement) contre la COVID-19, y compris en sensibilisant les groupes à haut risque.
Détecter	Identifier les signes et les symptômes, effectuer des tests de diagnostic rapide ou soutenir la collecte d'échantillons dans les communautés pour réduire le risque de transmission nosocomiale et assurer le transport rapide des échantillons vers les laboratoires.
Répondre	S'assurer que les résultats font l'objet d'une communication rapide et efficace pour les patients
	Soutenir l'auto-isolement et surveiller les patients tout en assurant un appui sous forme de nourriture, de soutien social et médical.
	Surveiller les patients pour une détérioration clinique et soutenir le renvoi rapide des patients qui ont besoin d'être hospitalisés.
	Mettre en œuvre ou soutenir la recherche de contacts, signaler les symptômes et suivre les contacts des patients infectés par la COVID-19 afin de garantir l'accès au dépistage et au traitement pour ceux qui présentent des signes et des symptômes
	Mettre en œuvre ou soutenir la désinfection des surfaces à haut risque dans les communautés
	Assurer des services de santé primaire de routine. Par exemple, s'assurer que les vaccinations ainsi que la gestion intégrée des cas dans la communauté sont maintenues en toute sécurité.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) – DEMARRER

ORDRE A OBSERVER POUR ENLEVER L'EPI

1. Gants
2. Lavage des mains
3. Lunettes / écran de protection
4. Lavage des mains
5. Masque facial
6. Lavage des mains

3 & 4

Enlevez les lunettes ou l'écran de protection (le cas échéant – non requis) et lavez vous les mains



Enlever sans toucher le devant des lunettes ou l'écran de protection

RUB HANDS FOR HAND HYGIENE! WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED

⌚ Duration of the entire procedure: 20-30 seconds



LES ASC PEUVENT ASSURER LA CONTINUITE DES SERVICES DE SANTÉ

Repérer les signes de danger au cours de la COVID-19



#18

1 Demander et repérer les signes de danger et cela, à 2m de distance


- ENREGISTRER: Code du signe de danger dans le formulaire pour la gestion des enfants malades

ASK				LOOK FROM 6 FEET	
A Fièvre de + 7 jours 	B Toux + 14 jours 	C Maux d'estomac + 14 jours 	D Sang dans les selles 	I Poitrine serrée 	J Somnole ou inconscient
E Convulsion 	F Inhabilité a boire ou a être allaité 	G Vomi tout 	AUTRE : Tout problème que vous ne pouvez pas traiter	K Red MUAC CHAs do <u>NOT</u> do MUAC during COVID-19	L Pieds enflés Have <u>caregiver</u> screen during COVID-19

Ils seront formés dans la prestation sécurée de services de santé

Services de Routine – Paludisme

#19



Planification familiale – passer des injectables aux pilules

1

Demander à la femme si elle prend du Sayana Press. Si oui, dites lui de:

- **Pour assurer notre sécurité et la votre, nous devons demeurer à 2m de distance**
- **Cela signifie que les ASC ne peuvent pas actuellement vous injecter le Sayana Press.**
- **L'ASC peut toutefois vous fournir d'autres méthodes de planification familiale en toute sécurité, comme les pilules ou les préservatifs.**
- **Deux options sûres vous sont disponibles :**

SI

La femme désire continuer à utiliser une méthode injectable de planification familiale, comme Sayana Press ou Depo



L'aiguiller vers une formation sanitaire

SI

La femmes désire passer a une méthode de contraception qui inclut la pilule ou les préservatifs



Continuer à fournir des conseils en matière de planification familiale

2

Fournir une éducation sanitaire sur la planification familiale, comme à l'habitude